



ANDROMEDA
Centro Medico
Specialistico

Salute e Benessere
per l'uomo e la donna

Centro Medico Specialistico Andromeda S.r.l.

Via G.B. Pergolesi, 4 - 20124 Milano

Tel 026690123 - fax 026702868

info@andromedacentromedico.it

Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Capicotto

P.IVA 09130120158 - Capitale Sociale euro 12.600,00 -

R.E.A. n°1271868

ISTRUZIONI PER I PAZIENTI CHE DEVONO SOTTOPORSI A BIOPSIA PROSTATICA

Le biopsie vengono effettuate in regime ambulatoriale, in anestesia locale; è consigliabile che il paziente venga accompagnato da una persona e che non debba tornare a casa guidando mezzi di trasporto.

Prima dell'esame:

In caso di terapia antiaggregante in atto, a causa dell'alto rischio di sanguinamento durante e dopo l'esame, sospendere almeno **7 gg.** prima l'eventuale terapia antiaggregante (Es. Aspirina, Aspirinetta, Cardioaspirina, Tiklid, Cardirene, Antigreg, Clox, Opteron) e per almeno **5 gg.** dopo la biopsia. Altri farmaci che abitualmente si usano (antipertensivi, gastroprotettori, ipoglicemizzanti) devono essere comunque assunti prima e dopo l'esame.

In caso di duplice terapia antiaggregante/coagulante orale (Es. Coumadin, Sintrom, Plavix, Piridamolo Clopidogrel, Ticlopidina, Platel, Abciximab, Integrilin, Aggrastat Tirofiban), presenza di stents coronarici o gravi cardiopatie, contattare il cardiologo con il quale si è in cura per valutare la sospensione o la sostituzione del/dei farmaco/i.

Portare elenco farmaci assunti quotidianamente

Eeguire un clistere (es. Clisma Lax) la sera prima dell'esame e la mattina stessa.

Iniziare terapia orale con **Levofloxacina 500 mg, 1 al giorno**, da **2 giorni prima** dell'esame e proseguendo il giorno stesso dell'esame e poi per **altri 5 giorni** dopo la biopsia. Se il paziente è allergico a farmaci chinolonici, si consiglia eseguire la preparazione con **Bactrim Forte 1 cp x 2 volte al giorno** (mattina e sera), da 2 giorni prima dell'esame e proseguendo il giorno stesso dell'esame e poi per altri 5 giorni.

Eeguire un **prelievo** per i seguenti esami ematochimici (validità degli esami non oltre 1 mese):
Esame Emocromocitometrico, Pt e PTT, Esame urine + uricoltura +antibiogramma e recarli al momento dell'esame.

Informare il personale sanitario di eventuali allergie a farmaci e delle terapie in corso.

Allegare la documentazione Urologica ed esami eseguiti (es. precedenti ecografie o biopsie, esami del sangue, lettere di dimissione ospedaliera). Presentarsi all'esame avendo assunto i farmaci abituali (eccetto gli antiaggreganti piastrinici), avendo bevuto liquidi e avendo fatto colazione o un pranzo leggero ;

non presentarsi a digiuno.

Dopo l'esame:

Rimanere in osservazione in sala d'aspetto per almeno 1 ora per valutare la ripresa di una corretta minzione , eventuale presenza di sangue nelle urine o dal retto

Nelle ore successive all'esame , in caso di impossibilità alla minzione (ritenzione di urina), di rialzo febbrile superiore a 38°C che non si risolve con la terapia medica per bocca o importante sanguinamento , recarsi al Pronto Soccorso più vicino al proprio domicilio.

E' importante ritirare il consenso informato prima dell'esame e , dopo averlo letto attentamente , riportarlo adeguatamente compilato e firmato in sede di esame; in caso di mancata consegna del consenso, mancata preparazione antibiotica , mancata sospensione di antiaggreganti o mancanza di esami o di impegnative mediche o di mancanza di documentazione clinica urologica , l'esame non sarà eseguito